

راهنمای ضد عفونی و گندزدایی

نحوه گندزدایی محیط و سطوح معمولی

برای این امر از محلول های کلر با **غلظت یک دهم درصد** استفاده می شود . برای تهیه این محلول باید یک سهم ماده سفید کننده تجارتي (وایتکس) با غلظت ۵ درصد را به ۴۹ سهم آب سرد و معمولی در ظرفی درب دار و ترجیحاً پلاستیکی اضافه نمود. (به عنوان مثال به ازای یک پیمانه وایتکس ۴۹ پیمانه آب به آن اضافه شود) حد اکثر زمان ماندگاری و قابل استفاده برای گند زدایی ۲۴ ساعت در نظر گرفته می شود .



نحوه گندزدایی محیط و سطوح آغشته به ترشحات بیماران

برای این امر از محلول های کلر با **غلظت نیم درصد** استفاده می شود . برای تهیه این محلول باید یک سهم سفید کننده تجارتي (وایتکس) با غلظت ۵ درصد را به ۹ سهم آب سرد و معمولی در ظرفی درب دار و ترجیحاً پلاستیکی اضافه کرد. حد اکثر زمان ماندگاری و قابل استفاده بودن این محلول (برای عملیات گندزدایی) ۲۴ ساعت است. (به عنوان مثال : به ازای هر ۱ پیمانه از محلول وایتکس ۹ پیمانه آب به آن اضافه می شود).

نحوه تهیه الکل ۷۰ درجه برای ضد عفونی :

بهترین غلظت برای میکروب کشی با الکل، **غلظت ۷۰ درجه** است. با توجه به این که الکل طبی موجود در بازار دارای غلظت ۹۶ درجه می باشد، برای تهیه الکل ۷۰ درجه بایستی به ازای هر ۳ سهم الکل یک سهم آب مقطر یا آب جوشیده سرد اضافه نمود . (به عنوان مثال به ازای ۳ پیمانه الکل طبی ۹۶ درصد یک پیمانه آب به آن اضافه شود)



بهرتر است محلول های گندزدا را روزانه تهیه کنیم .

به یاد داشته باشیم رعایت موارد ایمنی در تهیه محلول های گندزدا الزامی می باشد .